

سامهاڙو  
منهن ڪر، مهاڙو  
Foot And Mouth Disease



پساران  
پسنرڪٽڻ اٺيسر  
لانيو اسٽاڪ اينجمنٽ سمبيلنڊري ميرپورخاص  
ضلعی حڪومت ميرپورخاص  
0233-9290269-9290189

## سامهاڙو/منهن ڪر، مهاڙو

### Foot And Mouth Disease

وبائي مرض کي ختم ڪرڻ ڏاڍو ڏکيو عمل آهي. اهوئي سبب آهي جو بيماري ڪنهن به ملڪ جي جانورن لاءِ گهڻي نقصان جو ڪارڻ بڻجي ٿي، جنهن سان نه صرف عام ماڻهون پر ملڪ جي معاشي حالتن تي به خراب اثر پون ٿا. سامهاڙو (F.M.D) به جانورن ۾ ڦهلجندڙ بيمارين مان هڪ آهي. ان بيماري کي اڪثر ڪري منهن ۽ ڪر جي بيماري سڏيو وڃي ٿو. هن جو حملو شديد ٿئي ٿو. ۽ مرض پنهنجي پويان اهڙا اثر ڇڏيو وڃي ٿو، جيڪي خطرناڪ حد تائين معاشي نقصان جو سبب بڻجن ٿا. هن مرض جو حملو سڀ کان پهريائين يورپ ۾ 1544ع ۾ ٿيو هو. جيڪو ناقابل تلافِي حد تائين نقصان جو سبب بڻيو هو.

**متاثر ٿيل جانور:**

هي مرض گهڻو ڪري ڳئون، ٻڪري، رڍ ۽ سؤثر ۾ ملي ٿو. ڪنهن حد تائين مينهن کي به متاثر ڪري ٿو. پر ڳئون سڀ کان وڌيڪ هن مرض ۾ مبتلا ٿئي ٿي. ننڍي عمر وارا جانور هن ۾ جلد ئي مبتلا ٿي ويندا آهن. اٺ، ڪتو ۽ ٻلي به هن مرض سان متاثر ٿي سگهن ٿا. انهن مان ان جا امڪان ڪافي حد تائين گهٽ آهن.

### مرض جو سبب:

هي مخصوص قسم جا زهريلا جراثيم (نانجهه) واثرس هن مرض جو سبب بنجن ٿا. اهي واثرس جانورن جي خوراڪ يا پاڻي جي ذريعي جسم ۾ داخل ٿي بيماري پيدا ڪن ٿا. هن بيماري جا ست قسم آهن. پهريان ٽي قسم A.O ۽ C دنيا جي تقريباً هر ملڪ ۾ ملن ٿا. جڏهن ته Asia-1 شيءِ ۽ Sat-1, Sat-2, Sat-3 براعظم آفريڪا ۾ به ملن ٿا. انهن قسمن کان سواءِ ٻه ٻيا قسم آهن. هن واثرس کي سڀ کان پهريائين 1897ع ۽ 1900ع ۾ ٻن سائنسدانن لوفلر ۽ فروش ڪولهيو هٿو. جانورن جي جسم ۾ هن جو لڪل مدو تقريباً 2 کان 8 ڏينهن ٿئي ٿو.

### نشانيون:

سامهاري ۾ مرض جون نشانيون ٻن ڏينهن يا ڪنهن وقت ڪافي ڏينهن کان پوءِ ظاهر ٿين ٿيون. شروع ۾ جسماني گرمي جو درجو معمولي وڌي ٿو. بڪ ۾ گهٽتائي ۽ اڇ ۾ اضافو ٿي وڃي ٿو. هاضمي جو عمل خراب ٿي وڃي ٿو. جنهن کان پوءِ وات جي اندرئين جهلي زبان، چپ ۽ چاڙين ۾ داڻا ظاهر ٿين ٿا. جيڪي وڏي گلي تائين پهچي وڃن ٿا. ان سان گڏ بخار ۾ تيزي اچي ويندي آهي. انهن داڻن ۾ سياهه مادو ۽ ڪنو گند پيريل هوندو آهي. جيڪي 48 ڪلاڪن جي اندر ڦاٽي پوندا آهن. ۽ زخري پيدا ٿي پون ٿا. جنهن ۾ جانورن کي

سخت تڪليف محسوس ٿئي ٿي. جانور کاڌو ڇڏي ٿو. اوڳارڻ ۽ گھڻن کان پاسو ڪن ٿا. اکر مناسب صفائي نه ڪئي ويئي ته انهن دائن مان وهڻ وارو پاڻي وڌيڪ دائن جو سبب بڻجي ٿو. ان سان گڏ منهن مان تمام گھڻو لسيدار لعاب ۽ گجھي وهڻ شروع ٿئي ٿي. اهي دائا پنهنجي ڪرڻ جي وچ ۾ به بيدا ٿيندا آهن. جنهن جي فائنل سان زخمر ٿي پون ٿا. جانور زمين تي پير رکڻ ۾ تڪليف محسوس ڪندو آهي ۽ منڊ ڪاڻي هلندو آهي ۽ آهستي آهستي زمين تي هلندو آهي ڪڏهن پير کي چنڊيندو آهي ۽ کير جي بيداوار گھٽ ٿي ويندي آهي. ڪنهن ڪنهن وقت کير واري جانور جي نثن ۽ اوه تي به دائا ظاهر ٿيندا آهن. جيڪي زخمر بيدا ڪري ڏاڍي تڪليف جو سبب بڻجن ٿا. مناسب علاج نه ڪرڻ ڪري اهي زخمر ناسور بڻجي سگھن ٿا.

#### مرض پکڙجن جا سبب:

هي مرض اڪثر ڪري بيمار جانورن مان صحت مند جانورن ۾ مختلف طريقن سان منتقل ٿئي ٿو. متاثر جانور جي جشي، بيمار، کير ۽ گوشت مرض پکڙڻ جو سبب بڻجن ٿا. استعمال ٿيل پاڻي گاهه، کاڌ خوراڪ جا ٿاڻو، مالوند ماڻهن جا هٿ، ڪپڙا ۽ جوتا وغيره هن مرض کي هڪ جڳهه کان ٻئي جڳهه تائين صحتمند جانور تائين پهچڻ جو ذريعو بڻجن ٿا. ڪتا، ڪوئا ۽ مڪيون به سامهائڻو پکڙڻ ۾ اهم ڪردار ادا

ڪن ٿا. سامهائڙو گهڻو ڪري وڃين ۽ ڪجهه ڪرڻ موسم ۾ پڪڙجي ٿو. گهڻي گرمي يا گهڻي ٿڌ ۾ هي مرض نه ٿو لڳي يا شايد اتفاقن تي سگهي ٿو. ڇاڪاڻ ته هن مرض جي وائرس جا ڪيترائي قسم آهن. تنهنڪري هي هڪ ئي جانور ۾ ڪيترائي ڀيرا ٿي سگهي ٿو. هر ٻيري وائرس جا مختلف قسم هن جو سبب بڻجن ٿا.

#### بيماري جو مندو:

هن مرض جو حملو ۽ هن جي شدت، جانورن جي قوت مدافعت ۽ هن جي سار سنڀال جي دارو مدار تي آهي. اڪثر ڪري 2 کان 3 هفتا رهي ٿو. ليڪن حالتن جي مطابق حملو ٻوڏي به سگهي ٿو. جڏهن ته ننڍا زخرا گهڻو ڪري هڪ هفتي اندر پرڄي ويندا آهن.

#### مغاشي اثر:

هي هڪ موذي مرض آهي ۽ تمام گهڻي تيزي سان پڪڙجي ٿو. تنهن ڪري جانورن جي بيداواڙي صلاحيت کي متاثر ڪري ٿو. کير جي بيداواڙ گهٽ ٿي ويندي آهي. جانور کائڻ پيئڻ جديو ڏئي. هن جي جسماني قوت ڪمزور ٿي ويندي آهي ۽ هو سست ٿي ويندو آهي واڌ جو عمل سست ٿي ويندو آهي. جنهن سان گوشت ۽ کير جي پيداوار گهٽجي ويندي آهي. دنيا جا ڪيترائي ملڪ هن مرض جي اثر ۾ اچي گهڻو نقصان کشي چڪا آهن. هڪ اندازي جي مطابق يورپ

1951-52 ع ۾ 30,000. فرانس 1950-60 ع ۾ 1750،  
 ڪمبوڊيا 1980 ع ۾ 4500، بنگلاديش 1996 ع ۾  
 6250 ۽ برطانيه کي 1968 ع ۾ 2500 ڊالرن جو نقصان ٿيو  
 هو. برطانيه 2001 ۾ هڪ دفعو وري هن بيماريءَ جي اثر  
 هيٺ اچي چڪو آهي. جتي لکين جانور هن مرض کان متاثر ٿي  
 چڪا آهن. پاڪستان ۾ ڪافي هنڌن تان هن مرض جا اطلاع  
 ملن ٿا. ڇاڪاڻ ته هي موذي مرض آهي، تنهنڪري تيزي سان  
 ٻين جانورن جي جسم ۾ بڪٽري وڃي ٿو. جنهن ڪري  
 جانورن جي صحت ۽ ان جي پيداواري صلاحيت ڏاڍي متاثر ٿي  
 سگهي ٿي ۽ ملڪ جي معيشت تي به خراب اثر پئجي سگهن  
 ٿا. هن مرض ۾ جانورن جي موت جي حد گهڻو ڪري گهٽ  
 آهي. وڏن جانورن ۾ ته نه هئڻ جي برابر آهي. ننڍي عمر جي  
 جانورن ۾ 5 سيڪڙو جڏهن ته رڳو 10 کان 15 سيڪڙو  
 ٿئي ٿو. جيڪڏهن مناسب سار سنڀال نه ڪئي وئي ته موت جي  
 حد خطرناڪ حد تائين وڌي سگهي ٿي. بيماري ۾ مبتلا ٿيڻ  
 جي حد (Mortality rate) 90-99 سيڪڙو تائين آهي،  
 جنهن سان نه صرف بيماري جي وچ ۾ بلڪه صحت مند ٿيڻ  
 کان پوءِ به جانور پنهنجي اصل پيداواري صلاحيت تائين پهچڻ  
 ۾ وقت وٺندو آهي. تنهنڪري هي بيماري مالي نقصان جو سبب  
 بنجي ٿي.

### احتياطي آڀاء:

هن مرض کان بچاء لاء ضروري آهي ته هر 6 مهينن کانپوءِ بچاء جا ٽڪا لڳائڻ گهرجن. جنهن سان جانورن جي جسم ۾ بيماري جي خلاف قوت مدافعت پيدا ٿيندي آهي. يا جيڪڏهن بيماري واري ۾ موجود ڪنهن به هڪ جانور تي حملو ڪري ته ان کي يڪدم ٻين جانورن کان جدا ڪري واري کي جراثيم ڪش دوا سان ڌوئڻ گهرجي. واري ۾ متاثر ٿيل جانورن کي الڳ ڪرڻ گهڻو بهتر آهي.

### علاج:

هن مرض جو باقائدي ڪو به علاج نه آهي مرض جو وائرس پنهنجو مدو پورو ڪرڻ کانپوءِ خود بخود ختم ٿي وڃي ٿو. پر مرض کي وڌڻ کانپوءِ روڪڻ لاءِ ڪجهه احتياطي ۽ دوائون تجويز ڪري سگهجن ٿيون. جنهن جي ذريعي نقصان گهٽائي سگهجي ٿو. هن بيماري دوران صرف دوائون وڌيڪ ڪارآمد ثابت ٿين ٿيون. ڪمزوري جي صورت ۾ گلوڪوز جي انجڪشن ڏيئي سگهجي ٿي. متاثر جانور کي فوري طور تي صحتمند جانورن کان الڳ ڪرڻ کانپوءِ نرم ۽ خشڪ جاءِ تي ٻڌڻ گهرجي ۽ گرم ريتي تي هلائڻ فائدي مند آهي. جانور جي وات کي اندران ۽ ٻاهران جراثيم ڪش دوا سان ڌوئڻ گهرجي. پاڻي ۾ جراثيم ڪش دوا ملائي جانور کي ان ۾ ڪجهه دير بيهارڻ پڻ گهرجي. هن جا زخمي جڳهه ۽ طرح

انهيءَ بائي ۾ ڌوئڻ گهرجن. ساڻو گاهه وڌيڪ بهتر آهي. بهه نه ڏيڻ گهرجي ڇاڪاڻ ته بهه جانور جي وات ۾ زخميءَ تڪليف پهچائيندو.

### انسانن تي اثر:

هوئن ته انسانن جي صحت تي هن جا ڪي به اثر نه ٿا ٿين. پر ڪجهه اهڙا اطلاع به آهن. جنهن جي مطابق مستانر جانورن جو کير بيٺن سان منهن جي اندر ڦلڪڻا پيدا ٿي پوندا آهن ۽ انسان جي مٿي ۾ سور ۽ منفي اثر محسوس ڪري ٿو. پر ائين تمام گهٽ ٿيندو آهي.

